

alendronat

VS

PROTELOS

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter från NOMI Sverige AB.
Ytterligare information erhålls från NOMI Sweden, 08-555 21 400.



Nya konklusiva resultat från...

PROTELOS®
strontiumranelat

**SERVIER**

Servier Sverige AB Box 725, 169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00, Fax: 08-522 508 01

M-PRO-09-PROT-003-PF

Strontium ranelate has a more positive influence than alendronate on trabecular bone microstructure in women with postmenopausal osteoporosis

R Rizzoli , D Felsenberg , M Laroche , E Seeman , MA Krieg , I Frieling , T T

Strontium ranelate (SR) and alendronate (ALN) are anti-osteoporotic agents with proven efficacy against vertebral and non-vertebral fractures. Whereas ALN is a pure bone resorption inhibitor, SR in vitro, increases bone formation and decreases bone resorption. For the first time, we conducted and compared the effects of SR and ALN on bone microstructure, a component of bone quality.

“For the first time, we non-invasively compared the effects of Protelos and alendronate”

Primary endpoint was HR-pQCT variables relative changes from baseline at 1 year of treatment in the spine and hip areal BMD and bone turnover markers.

Baseline characteristics (mean±SD) were similar in both groups:age:63.7±7.4years;lumbar and hip T-Score:-2.7±0.9g/cm² and -2.0±0.8g/cm², respectively. After 1 year of treatment, aBMD increases were similar to results from pivotal trials (L1-L4:+5.7% and +5.1%;total hip:+3.3% and +2.2%, in SR and ALN groups, respectively). For bone microstructure, mean increases were +5.3% (p=0.002) for BV/TV and +2.1% (p=0.002) for trabecular thickness. There was no change in cortical thickness.

“Protelos had significantly higher effects than alendronate”

In conclusion, strontium ranelate had significantly higher effects than alendronate on distal tibia microstructure including cortical and trabecular variables, in women with postmenopausal osteoporosis after one year of treatment.

Ref. Rizzoli R, Felsenberg D, Laroche M, et al. Osteoporosis Int. 2009;20:165-166. Abstract OC 37.

POSTA ELLER FAXA TILL 08-522 50 801

Bäste/bästa Dr,

Protelos har en unik dubbel verkningsmekanism i och med att den hämmar de bennedbrytande cellerna och stimulerar de benuppbyggande cellerna. Detta leder till en förändring av benomsättningen till benuppbyggnadens fördel. Denna verkningsmekanism är helt annorlunda jämfört med alendronat*.

Nu har **den första direkt jämförande studien mellan Protelos och alendronat** presenterats. Denna studie har undersökt hur de båda läkemedlena påverkar benets mikroarkitektur. Resultaten är glasklara. Protelos har en signifikant bättre effekt både på det trabekulära och kortikala benet.

Vi träffar gärna er för att berätta mer om denna studie och den starka dokumentation som Protelos har.

Vänliga hälsningar

Patrik Friberg

Patrik Friberg
Product Manager
Tel. 08-522 50 814

Eivor Andersson
Booking Assistant
Tel. 044-859 10
Fax. 08-522 508 01
E-mail. Eivor.andersson@se.mailqrs.com



*www.fass.se


PROTELOS
strontiumranelat

SVARSKORT

☐ **Ja tack,** jag/vi vill ta del av de nya resultaten på PROTELOS

☐ **Ja tack,** Jag/vi vill gärna ha boken
“Innovation in skeletal medicine”

☐ Min huvudman godkänner en
personlig kontakt



Frankeras
ej
Servier
betalar
portot

Servier Sverige AB
Att: Eivor Andersson

SVARSPOST
Kundnummer 204 823 44
169 20 SOLNA

KONTAKTPERSON

ARBETSPÅS

TELEFONNUMMER

E-POST

Under de senaste åren har det skett stora framsteg inom forskning kring skelettet och dess sjukdomar.

Denna hyperaktuella bok tar upp det senaste inom genetik, riskbedömning och behandling.

Boken belyser verkligen vad som är ”state of the art” inom framförallt osteoporos.



PROTELOS (strontiumranelat) R_x, medel som påverkar benvävnad och mineralisering.
Indikation: Behandling av postmenopausal osteoporos för att minska risken för vertebral- och höftfrakturer.
Förpackningar: Granulat till oral suspension, 2 g gult granulat i dospåse 28 st och 84 st.
Pris (AUP): Dospåse 28x1 368:50 SEK; Dospåse 84x1 1012:50 SEK.

Varningar och försiktighet: Allvarliga hypersensitivitetssyndrom har förekommit och patienter ska informeras om att upphöra behandlingen med PROTELOS omedelbart och permanent om hudutslag uppkommer, samt kontakta sjukvården. För mer information se www.fass.se

LFN beslut om subvention: Protelos ingår i läkemedelsförmånerna för benskörhetsbehandling av postmenopausala kvinnor och subventioneras endast för: Kvinnor som vid behandlingsstart är 74 år eller äldre och kvinnor som inte kan behandlas med bisfosfonater.
Datum för översyn av produktresumén: 2008-01-25

