

Servier Sverige AB
Att: Patrik Friberg

SVARSPOST


Kundnr 204 823 44
169 27 SOLNA

Ämnen & Ämnen / Rättstället

A



PORTO BETALT



Adresskälla: www.hsar.se 08-555 214 20

Valdoxan (agomelatin) R_x N06AX22 (övrigt antidepressivum). Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Melatonerg MT och MT agonist och 5-HT antagonist. Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. Inga utsättningssymptom eller effekt på den sexuella funktionen, kroppsvikt, puls eller blodtryck. Dosering: Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) Varningar och försiktighet: Användning till barn och ungdomar, äldre patienter med demens, Mani/Hypomani, suicid/suicidtankar, kombination med CYP1A2-hämmare och laktosintolerans. Förhöjning av serumtransaminaser (>3 gånger den övre gränsen av normalvärdet) har i kliniska studier observerats hos patienter som fått Valdoxan, särskilt i 50 mg dos (d.v.s. 1,1 % för agomelatin 25/50 mg mot 0,7 % för placebo). Serumtransaminaserna återvände vanligtvis till normal nivå vid utsättande av Valdoxan. Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter: i början av behandlingen och sedan periodvis efter cirka sex veckor (slutet på akutfasen), tolv och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat.

25 mg tabletter x 28 st = 441,00 SEK (AUP), 25 mg tabletter x 84 st = 1144,00 SEK (AUP). Senaste översyn av produktresumén juli 2011. För fullständig information se www.fass.se



Servier Sverige AB,
Box 725, 169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00
www.valdoxan.com

Valdoxan
(agomelatin)




M-PRO-11-VALD-049-PF

inbjudan

STRAND HOTELL 20 SEPTEMBER 2011

**20 september arrangerar vi
ett post-ECNP-möte med ett koncentrat
från den 24:e ECNP-kongressen i Paris**



Servier Sverige AB
Att: Patrik Friberg

SVARSPÖST


Kundnr 204 823 44
169 27 SOLNA

Ännan & Ännan / Ristatlet

A



PORTO BETALT



Adresskälla: www.hsar.se 08-555 214 20

Valdoxan (agomelatin) R_x N06AX22 (övrigt antidepressivum). Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Melatonerg MT och MT agonist och 5-HT antagonist. Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. Inga utsättningssymptom eller effekt på den sexuella funktionen, kroppsvikt, puls eller blodtryck. Dosering: Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) Varningar och försiktighet: Användning till barn och ungdomar, äldre patienter med demens, Mani/Hypomani, suicid/ suicidtankar, kombination med CYP1A2-hämmare och laktosintolerans. Förhöjning av serumtransaminaser (>3 gånger den övre gränsen av normalvärdet) har i kliniska studier observerats hos patienter som fått Valdoxan, särskilt i 50 mg dos (d.v.s. 1,1 % för agomelatin 25/50 mg mot 0,7 % för placebo). Serumtransaminaserna återvände vanligtvis till normal nivå vid utsättande av Valdoxan. Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter: i början av behandlingen och sedan periodvis efter cirka sex veckor (slutet på akutfasen), tolv och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat.

25 mg tabletter x 28 st = 441,00 SEK (AUP), 25 mg tabletter x 84 st = 1144,00 SEK (AUP). Senaste översyn av produktresumén juli 2011. För fullständig information se www.fass.se



Servier Sverige AB,
Box 725, 169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00
www.valdoxan.com

Valdoxan
(agomelatin)



M-PRO-11-VALD-049-PF

inbjudan

STRAND HOTELL 20 SEPTEMBER 2011

**20 september arrangerar vi
ett post-ECNP-möte med ett koncentrat
från den 24:e ECNP-kongressen i Paris**

SISTA CHANSEN



Bästa(e) doktor

VI HAR NÖJET ATT BJUDA IN DIG TILL ETT KVÄLLSMÖTE med redovisning i symposieform av de senaste rönen från ECNP, "European College of Neuropsychopharmacology". Föreläser gör professor Jerker Hetta, docent Maj-Liz Persson, överläkare Lennart Runeson och överläkare Vladimir Medvedev. Moderator; överläkare Sergej Andréewitch.

Jerker Hetta

Professor i psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Jerker Hetta har under många år forskat kring sömn och dess koppling till bland annat depression.

Maj-Liz Persson

Docent Maj-Liz Persson från Beroendekliniken på Huddinge Universitetssjukhus. Maj-Liz Persson har varit huvudprövare i ett antal kliniska studier, däribland flera studier med Valdoxan (agomelatin) och forskar på störningar i biologiska rytmer och psykisk sjukdom.

Vladimir Medvedev

Överläkare på Årsta Vantörs Psykiatriska Öppenvårdsmottagning.

Lennart Runeson

Överläkare vid affektivt centrum, S:t Görans sjukhus.

Sergej Andréewitch

Sergej Andréewitch, överläkare vid mottagningarna för OCD och Internetpsykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Cecilia Ribaric
Key Account Manager
Servier Sverige AB
cecilia.ribaric@telia.com
Tel: 070-673 92 01

Patrik Friberg
Product Manager, Valdoxan
Servier Sverige AB
patrik.friberg@se.netgrs.com
Tel: 070-165 08 14

Program

Moderator	Överläkare Sergej Andréewitch
17.30 – 18.00	Samling med kaffe och tilltugg
18.00 – 19.45	Rapportering från ECNP med: <i>Professor Jerker Hetta</i> <i>Docent Maj-Liz Persson</i> <i>Överläkare Vladimir Medvedev</i> <i>Överläkare Lennart Runeson</i>
19.45 – 20.00	Cecilia Ribaric från Servier: Nyheter från kongressen angående Valdoxan (agomelatin) <i>Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andra-handsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.</i>
20.15	Middag i anslutning till konferenslokalen

Tid och plats för kvällsmötet

Datum:	Tisdag 20 september 2011
Tid:	17.30 Samling med kaffe och tilltugg
Plats:	Strand Hotel Nybrokajen 9, lokal: Maritim Middag kommer att serveras kl. 20.15 i anslutning till konferenslokalen

Svarskupong O.S.A. senast 12 september 2011

- ☐ Ja tack, jag vill gärna delta vid kvällsmötet
- ☐ Jag vill gärna delta vid middagen
- ☐ Min huvudman godkänner deltagande

Enligt överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skall ditt deltagande vara godkänt av huvudman.

Kontaktperson

Arbetsplats

Telefonnummer

E-post

Tisdag 20 september 2011, kl 17.30
Strand Hotel Nybrokajen 9, lokal: Maritim

