

Servier Sverige AB
Att: Patrik Friberg

SVARSPÖST

Kundnr 204 823 44
169 27 SOLNA

Ännan & Ännan / Ristatlet

A



PORTO BETALT

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter från NOMI Sverige AB.
Ytterligare information erhålls från NOMI Sweden, 08-555 21 400.

Valdoxan (agomelatin) R_x N06AX22 (övrigt antidepressivum). Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Melatonerg MT och MT agonist och 5-HT antagonist. Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. Inga utsättningssymptom eller effekt på den sexuella funktionen, kroppsvikt, puls eller blodtryck. Dosering: Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) Varningar och försiktighet: Användning till barn och ungdomar, äldre patienter med demens, Mani/Hypomani, suicid/ suicidtankar, kombination med CYP1A2-hämmare och laktosintolerans. Förhöjning av serumtransaminaser (>3 gånger den övre gränsen av normalvärdet) har i kliniska studier observerats hos patienter som fått Valdoxan, särskilt i 50 mg dos (d.v.s. 1,1 % för agomelatin 25/50 mg mot 0,7 % för placebo). Serumtransaminaserna återvände vanligtvis till normal nivå vid utsättande av Valdoxan. Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter: i början av behandlingen och sedan periodvis efter cirka sex veckor (slutet på akutfasen), tolv och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat.

25 mg tabletter x 28 st = 441,00 SEK (AUP), 25 mg tabletter x 84 st = 1144,00 SEK (AUP). Senaste översyn av produktresumén juli 2011. För fullständig information se www.fass.se



Servier Sverige AB,
Box 725, 169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00
www.valdoxan.com

Valdoxan
(agomelatin)

M-PRO-11-VALD-052-PF



**Cirkadianska rytmer, sömn
och en patients berättelse**

Servier Sverige AB
Att: Patrik Friberg

SVARSPOST

Kundnr 204 823 44
169 27 SOLNA

Ännan & Ännan / Ristatlet

A



PORTO BETALT

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter från NOMI Sverige AB.
Ytterligare information erhålls från NOMI Sweden, 08-555 21 400.

Valdoxan (agomelatin) R_x N06AX22 (övrigt antidepressivum). Behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Melatonerg MT och MT agonist och 5-HT antagonist. Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. Inga utsättningssymptom eller effekt på den sexuella funktionen, kroppsvikt, puls eller blodtryck. Dosering: Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas till 50 mg en gång dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros eller aktiv leversjukdom) Samtidig användning av en potent CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) Varningar och försiktighet: Användning till barn och ungdomar, äldre patienter med demens, Mani/Hypomani, suicid/ suicidtankar, kombination med CYP1A2-hämmare och laktosintolerans. Förhöjning av serumtransaminaser (>3 gånger den övre gränsen av normalvärdet) har i kliniska studier observerats hos patienter som fått Valdoxan, särskilt i 50 mg dos (d.v.s. 1,1 % för agomelatin 25/50 mg mot 0,7 % för placebo). Serumtransaminaserna återvände vanligtvis till normal nivå vid utsättande av Valdoxan. Leverfunktionstester skall utföras hos alla patienter: i början av behandlingen och sedan periodvis efter cirka sex veckor (slutet på akutfasen), tolv och tjugofyra veckor (slutet på underhållsfasen) och därefter när det är kliniskt indicerat.

25 mg tabletter x 28 st = 441,00 SEK (AUP), 25 mg tabletter x 84 st = 1144,00 SEK (AUP). Senaste översyn av produktresumén juli 2011. För fullständig information se www.fass.se



Servier Sverige AB,
Box 725, 169 27 Solna
Tel: 08-522 508 00
www.valdoxan.com

Valdoxan
(agomelatin)

M-PRO-11-VALD-052-PF

SISTA CHANSEN


Inbjudan



Cirkadianska rytmer, sömn och en patients berättelse

Välkommen till ett kvällsmöte, torsdag 13 oktober 2011. Kvällens talare är professor Jerker Hetta och Arvid Lagercrantz. Moderator är överläkare Mats Humble

Professor Jerker Hetta är verksam vid Karolinska Institutet. Jerker Hetta har under många år forskat kring störda cirkadianska rytmer och dess koppling till bland annat depression. Överläkare Mats Humble är verksam vid avdelningen för äldrepsykiatri kommer vara moderator/föreläsare på detta möte. Dr. Humble har stor klinisk erfarenhet och bedriver forskning inom psykiatri.



Arvid Lagercrantz är journalist och var under 1970- och 1980-talen politisk reporter och kommentator i Dagens Eko/Sveriges Radio. Senare blev han P1-chef, vice VD och VD vid Sveriges Riksradio. Under 2000-talet arbetade han som programledare och reporter vid Sveriges Television och Axess TV. Arvid Lagercrantz fick redan i tidig ålder diagnosen psychosis manico-depressiva och kommer dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Han kommer berätta om hur han klarade av att arbeta som journalist mellan de maniska perioderna och turerna in och ut från de psykiatriska klinikerna samt om tvångsintagningen på Beckomberga.

Han kommer att delge sina tankar och reflektioner om den kemiska och biologiska kopplingen till sjukdomen och de anhörigas situation.

I dag lever Arvid med diagnosen bipolär sjukdom typ 1 och i boken "Mitt galna liv" liksom vid detta kvällsmöte kommer han berätta han om de olika stadierna fram till acceptandet av sjukdomen.

Patrik Friberg är produktchef och kommer att ge en kort uppdatering kring Valdoxan® (agomelatin), som är ett läkemedel för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan® ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression.

Med vänliga hälsningar
Servier Sverige AB

Patrik Friberg
Product manager, Valdoxan
Servier Sverige AB
patrik.friberg@se.netgrs.com
Tel: 070-165 08 14

Program

- | | |
|---------------|---|
| 17.30 – 18.00 | Samling med fika och något att äta |
| 18.00 - 18.10 | Introduktion av överläkare Mats Humble |
| 18.10 – 18.55 | Föreläsning av professor Jerker Hetta om
Cirkadianska rytmer och dessas påverkan på sömn och
endokrina funktioner |
| 18.55– 19.40 | Arvid Lagercrantz berättar |
| 19.40– 19.55 | Valdoxan® i praktiken, kort uppdatering från Servier av
Patrik Friberg |
| 19.55– 20.10 | Frågestund och diskussion |
| 20.10 – | Middag på Clarion Hotell Gillet |

Tid och plats för kvällsmötet

- | | |
|--------|--|
| Datum: | Torsdag 13 oktober 2011 |
| Tid: | Samling kl 17.30 med kaffe och macka |
| Plats: | Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala |



Valdoxan®
(agomelatin)

Svarskupong O.S.A. senast 5 oktober 2011

☐ **Ja tack, jag vill gärna delta vid kvällsmötet**

☐ **Jag vill gärna delta vid middagen**

Enligt överenskommelsen mellan Läkemedelsindustri-föreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skall ditt deltagande vara godkänt av huvudman.

☐ **Min huvudman godkänner deltagandet**

Kontaktperson

Arbetsplats

Telefonnummer

E-post

Torsdag 13 oktober 2011, kl 17.30
Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala